

تحديث معلومات الرعاية الطبية بعد العلاج


خدمة دعم الهاتف للممرضات: 1300888022

ساعات العمل: الاثنين - الجمعة، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً

معلومات عن التخدير



يرجى أن تقرأي هذا الدليل
بعناية وسائلينا إذا كان لديكِ
أي أسئلة.



أنواع التخدير

قد يعتمد نوع التخدير الذي تختاريه على:

- نوع العملية التي تخضعين لها
- العيادة التي تجرين فيها العملية
- أي حالات طبية قد تعانين منها
- تفضيلك الشخصي.

التخدير الموضعي:

تُعطى حقنة لتخدير جزء من الجسم. سوف تكونين مستيقظة وواعية لما يحدث. قد تشعرين ببعض الانزعاج أثناء العملية.

التخدير الوريدي:

تُستخدم إبرة لوضع أنبوب بلاستيكي رفيع في وريد في الجزء الخلفي من يدك أو ذراعك. يتم إعطاء كميات صغيرة من الدواء ليجعلك مسترخية وننسانة. في معظم الحالات، لن تكوني واعية أثناء العملية، أو تتذكريها بعد ذلك.

• التخدير الوعي:

في بعض الأحيان يكون هناك حاجة لمستوى أخف من التخدير أو يُفضل. ستظلين تشعرين باللناس، ولكن لستِ فاقدة للوعي، وقد يكون لديك بعض الوعي بما يحدث.

التخدير العام:

يحدث هذا الأمر عندما تكونين فيه غائبة عن الوعي ولن تشعري بألم أثناء العملية. يتم إعطاء الأدوية بنفس الطريقة كما هو مع التخدير أو كما هو مع تنفس غازات. ستحتجين إلى مساعدة في التنفس بواسطة قناع أو أنبوب التنفس. نحن فقط نستخدم هذا النوع من التخدير للربط البوقي (ربط الأنابيب).

التخدير الوريدي والمخاطر

هذا هو التخدير الأكثر شيوعاً للإجهاض الجراحي. كما أنه يستخدم في بعض الأحيان مع إدخال اللولب (IUD) واستئصال القناة الدافقة.

سيقوم طبيب مدرس على نحو خاص بفحص صحتك ومناقشة التخدير وأي مخاطر. إن هذا الطبيب سوف يعطيك التخدير الخاص بك ويعتني بك أثناء عملية. الرجاء أن تخبر طبيبك إذا كنت قد واجهت أي مشاكل مع التخديرات السابقة. إن التخدير الحديث آمن بشكل عام ولكن هناك بعض المخاطر.

رد فعل تحسسي:

قد تتعانين من رد فعل تحسسي من أدوية التخدير. وهذا أمر نادر الحدوث. الرجاء أخبر الطبيب عن أي ردات تحسسية سابقة.

تشنج مجرى الهواء:

قد يضيق مجرى الهواء لديك مما يجعل التنفس صعباً. أخبري الطبيب إذا كنت تدخنين، أو إذا كنت تعانين من الربو أو إذا أصبحت مؤخراً بالزكام أو بالتهاب في الصدر لأن ذلك قد يزيد من الخطر.

السفط:

قد تتقيأين وتستنشقين سائلاً من المعدة. ويمكن لهذا الأمر أن يؤثر على تنفسك ويسبب التهاباً رئوياً. من المهم جداً أن تتبعي تعليمات الصوم المعطاة. وهذا سوف يقلل من خطر السقط عند التخدير.

قد تكون هناك مخاطر أخرى نادرة تؤثر على القلب أو الرئتين. وقد تكون هناك أيضاً مخاطر خاصة بك. سوف يناقش طبيبك أي مخاطر أخرى ذات صلة بك. !

التحضير للتخدير الوريدي

١٠) تذكرى: إذا اخترت أن تخضعى للتخدير الوريدى، فإنه يجب على شخص داعم لك أخذك إلى المنزل وأن يبقى معك حتى اليوم التالى لإجراء العملية.

إرشادات الصيام:

إذا كنت ستخضعين للتخيير الوريدي فيجب عليك أن تتبعي هذه القواعد.
وإذا لم تتبعي هذه القواعد فيتيقّن علينا تأخير موعدك أو الإلغاء.

التحضير لموعدك

لا شرب الكحول	ساعة قبل موعدك 24
لا تأكل أي شيء (بما في ذلك مصاصات الحلوى والعلكة). يمكنك الاستمرار في شرب 1 كوب صغير من الماء في الساعة.	ساعات قبل موعدك 6
لا شرب شيئاً	ساعة قبل موعدك 2

يمكّن تناول دواعك المعتمد مع كوب صغير من الماء ما لم يطلب منك أحد من طاقم العمل عندا عدم القيام بذلك.

بعد التخدير الوريدي

لا يمكنك الخضوع لتخدير وريدي إلا إذا فهمت ورتبتي ما يلي:

يجب أن يأتي شخص داعم لك إلى العيادة لأخذكِ

بعد عمليتك

ويجب أن يأخذك الشخص الداعم لك إلى المنزل

(لا يمكنك أن تأخذني سيارة أجرة / أوبر إلى المنزل
بمفردكِ)

يحتاج شخص داعم لك أن يبقى معك طوال الليل
بعد العملية

الليلة بعد العملية

لا تقددي أو تشغلي آلية

لمرة 24 ساعة بعد عملية

لا تشربي الكحول

لا تتخدي أي قرارات مهمة أو قانونية

الرضاعة الطبيعية بعد التخدير

إذا كنت ترضعين حالياً، تأكدي من أنك قد استعدت مسبقاً بما يكفي لتغطية الوقت الذي ستكونين فيه صائمة وتحضررين إلى العيادة. بالنسبة للأدوية المستخدمة في عياداتنا، لا يوجد أوقات انتظار أو ضرورة للتخلص منها. بعد إجراء العملية، يمكنك مواصلة الرضاعة الطبيعية كالمعتاد.

**خدمتنا الهاتفية للرعاية اللاحقة التي
تعمل على مدار 24 ساعة تعمل على
توصيلك بالممرضات المسجلات من
ذوي الخبرة في أي وقت من النهار
أو الليل.**



**24/7 رعاية
لاحقة مجانية**

اتصل بمرضات الرعاية اللاحقة
على الرقم 022 888 1300
إذا كان لديك أي مخاوف

الرعاية والدعم قبل عمليتكِ وأثناءها وبعدها

مترجم:

اتصلني بالرقم 131 450

واطابي أن يتم إيفصالك

ب MSI Australia

على الرقم 1300 003 707

رعاية لاحقة:

1300 888 022

msiaustralia.org.au

