



사후관리 정보 업데이트


간호사 전화 지원 서비스: 1300888022

운영 시간: 월요일 - 금요일, 오전 8 시 - 오후 5 시

수면 마취 안내



이 가이드를 자세히 읽어
보시고 질문이 있으시면
저희에게 알려주세요.



마취의 종류

환자가 선택하게 되는 마취의 종류는 다음에 의해 결정될 수 있습니다:

- 수술의 종류
- 수술이 이루어지는 클리닉 병원
- 앓고 있는 질병
- 선호 사항

국소 마취:

마취 주사로 신체 일부의 신경을 마비시키는 것입니다. 의식이 있는 상태에서 주위에서 일어나는 일들을 인지할 수 있습니다. 수술 중 불편함을 느낄 수 있습니다.

IV 수면 마취:

손이나 팔 뒤의 정맥에 가는 플라스틱 튜브를 삽입하기 위해 주사기를 사용합니다. 소량의 약품이 투입되어 긴장을 완화시키고, 수면을 유도합니다. 대개 수술 중에는 의식이 없거나, 이후에 기억이 안 납니다.

• 의식 있는 수면 마취:

때로는 가벼운 수면 마취 정도로 충분할 수가 있습니다. 졸음은 오지만, 수술 중 다소 의식이 있을 수 있습니다.

일반 마취:

완전히 의식을 잃고, 수술 중 통증을 전혀 느끼지 못하게 되는 상황입니다. 수면 마취와 같은 방식으로 또는 가스 형태로 흡입하는 방식으로 약물이 투입됩니다. 때로는 호흡 마스크나 호흡 튜브가 필요할 것입니다. 이 종류의 마취는 난관 결찰술 (난관 끓기)에만 사용됩니다.

IV 수면 마취 및 위험

임신중절 수술에 대한 가장 일반적인 마취 방법입니다. 또한 IUD 삽입 및 정관 수술에 가끔 사용되기도 합니다.

특별히 훈련 받은 의사가 건강을 점검하고, 마취 종류 및 그에 따른 위험을 설명해 드릴 것입니다. 해당 의사가 수면 마취를 할 것이고 수술 중에 환자를 담당하게 됩니다.

과거에 마취 관련 문제가 있었다면 의사에게 반드시 알려주시기 바랍니다.

현대의 마취는 일반적으로 매우 안전하나, 일정한 위험이 따릅니다.

알레르기 반응:

마취제에 대한 알레르기 반응이 있을 수 있습니다. 이러한 경우는 매우 드뭅니다. 과거의 알레르기 반응에 대해 담당 의사와 상담하세요.

기도 발작:

기도가 좁아져서 호흡이 어려울 수 있습니다. 흡연자이거나, 천식 환자 또는 최근에 감기나 독감을 앓았다면, 위험이 더 높을 수 있으니, 의사에게 반드시 알려주세요.

흡인:

구토를 하거나, 위로부터 액체를 흡입할 수 있습니다. 그럴 경우, 호흡 곤란을 가져오고 폐암을 유발시킬 수 있습니다. 금식/금주 지시 사항을 따르는 것이 매우 중요합니다. 그러면 마취했을 때 흡인의 위험을 줄일 수 있습니다.

- ❶ 심장이나 폐에 영향을 주는, 흔치 않은 기타 위험이 있을 수 있습니다. 또한 특정 환자에게만 해당되는 위험도 있을 수 있습니다. 환자에게 관련되는 기타 위험 사항에 대해 담당 의사가 상의드릴 것입니다.

IV 수면 마취 준비

- ❶ 기억할 것: IV 수면 마취를 선택할 경우, 환자의 보호자가 반드시 집으로 데려가고, 수술 다음날까지 함께 있어야 합니다.

금식/금주 안내:

IV 수면 마취를 한다면, 다음 사항을 반드시 따르도록 하세요.
다음 사항을 따르지 않는다면, 예약이 지연되거나 취소될 수 있습니다.

예약 준비:

예약 24 시간 전	술을 마시지 마세요.
예약 6 시간 전	취식하지 마세요. (사탕 및 껌 포함) 매시간마다 소량의 물은 계속 마셔도 됩니다.
예약 2 시간 전	아무것도 마시지 마세요.

정기 복용약은 저희 직원이 복용 금지를 요청한 경우를 제외하고 소량의 물과 함께 복용해도 됩니다.

IV 수면 마취 이후

다음을 이해하고 준비하지 않으면 IV 수면 마취를 할 수 없습니다:

수술 이후	환자의 보호자가 클리닉에 와서 반드시 동행해고 가야 합니다. 보호자는 환자를 반드시 집으로 데려가야 합니다. (혼자 우버나 택시를 타고 집으로 갈 수 없습니다)
수술 후 야간	환자의 보호자는 수술 후 야간에 함께 집에 있어야 합니다.
수술 후 24 시간 동안	운전하거나 기계를 작동하지 마세요 술을 마시지 마세요. 중요하거나 법적인 결정을 내리지 마세요.

수면 마취 후 모유 수유

현재 모유 수유를 하고 있다면, 금식 기간 및 클리닉에 있는 기간 동안 수유할 모유를 충분히 준비해 두기 바랍니다. 클리닉에서 사용되는 약품에 대해서는 대기 기간이나 폐기가 필요치 않습니다. 수술 후 정상적으로 모유 수유를 계속할 수 있습니다.

저희 24 시간 애프터케어 전화 서비스를 통해 밤낮없이 언제라도 여러분을 숙련된 간호사와 연결시켜 드립니다.

안녕하세요



무료 24/7 애프터케어

문제가 있으시면, 저희 애프터케어 간호사에게 1300 888 022 번으로 연락해 주세요.

수술 전, 수술 중, 수술 후의 케어 및 지원

통역 서비스:

131 450 번에 전화해서,

MSI Australia

1300 003 707

번으로 연결해달라고

요청하세요

24/7 수술 후케어:

1300 888 022

msiaustralia.org.au

