

الخدمات العيادية رعاية طبية


العلاج بعد الطبية الرعاية معلومات تحديث
1300888022 : للممرضات الهاتف دعم خدمة
مساءً 5 الساعة حتى صباحاً 8 الساعة من ، الجمعة - الاثنين : العمل ساعات

أثناء وجودك في
العيادة
الصفحة 2

بعد
علاجك
الصفحة 6

المخاطر
الصفحة 12

منع الحمل
والرعاية اللاحقة
الصفحة 16





الرعاية والدعم قبل الإجراء الخاص بك وأثناءه وبعده

المترجم الشفهي:

اتصلني بالرقم 131 450 واطلبي الاتصال بـ MSI Australia على الرقم 1300 003 707

24/7 رعاية لاحقة:

1300 888 022

msiaustralia.org.au

أثناء وجودك في العيادة



ما هو الإجهاض الدوائي؟

الإجهاض الدوائي هو طريقة آمنة وفعالة لإنهاء الحمل المبكر باستخدام الدواء (الحبوب) بدلاً من الجراحة.

١ يجب أن تبقى على بعد لا يتجاوز ساعتين للوصول إلى جهات الرعاية الطبية الطارئة المتوفرة على مدار 24 ساعة في أول 3 أو 4 أيام من الإجراء. يجب أن تكوني قادرة على الوصول إلى طبيب أو مستشفى أو إحدى عياداتنا إلى أن يكتمل الإجراء.

لا تسافري إلى الخارج حتى تتأكد من اكتمال الإجهاض.

توقع قضاء حوالي ساعتين في العيادة.

ستخضعين لصورة الموجات فوق الصوتية للتحقق من عدد أسبوع حملك.

- لن نجعلك ترين صورة الموجات فوق الصوتية ما لم تطلب روئيتها
- نحتاج إلى التتحقق من أنك لم تتعدي 9 أسبوع (63 يوماً) من الحمل للمضي قدماً في الإجهاض الدوائي.

ستحصلين على استشارة مع كل من الممرضة والطبيب.

سوف تتحدث معك الممرضة على انفراد. سوف يسألونك عن قرارك وما إذا كنت متأكدة من المضي في الإجراء. ثم يُسمح للشخص الداعم لك بالانضمام إليك خلال الاستشارة.

- سوف نسأل عن تاريخك الطبي وحالات الحمل السابقة
- سوف نشرح العلاج وأيضاً أي مخاطر
- يمكنك طرح أي أسئلة قد تكون لديك
- سنناقش خياراتك الخاصة بمنع الحمل وفحص الصحة الجنسية
- يمكن البدء فوراً ببعض طرق منع الحمل.

فحص خاص بالصحة الجنسية.

ما لم تطلبني عدم القيام بذلك، سوف نفحصك بحثاً عن العدوى المنقوله جنسياً في موعدك. يمكنك أيضاً اختيار إجراء فحص عنق الرحم (المعروف سابقاً باسم مسحة عنق الرحم) في نفس الوقت.

- هذه الفحوصات مجانية
- سوف نتصل بك فقط في حال كانت نتائج الفحوصات إيجابية أو غير طبيعية
- يمكنك طلب إرسال نسخة من نتائجك إلى GP (طبيبك العام).


أكتب أي أسئلة لديك هنا.

الخطوة 2 (الميزوبروستول)

إن الحبة الثانية التي ستتناولينها تسمى الميزوبروستول. الميزوبروستول هو بروستاغلاندين. وهذا سيسبب تشنج رحمك وسيسبب استرخاء عنق الرحم حتى يمكن للحمل أن يخرج.

- سنعطيك 4 أقراص من الميزوبروستول لتأخذيها معك إلى المنزل. يمكنك تناولها في أي وقت خلال **24-48** ساعة من تناول الميفيريستون (الخطوة 1)
 - إذا كان حملك أكثر من 7 أسابيع، نوصي بالانتظار حتى 48-36 ساعة بعد تناول الميفيريستون لأن ذلك قد يكون أكثر فعالية
 - ضعي 4 أقراص ميزوبروستول في فمك بين اللثة والخد واحتفظي بها هناك. ستصبح الأقراص لينة ولكنها قد لا تذوب تماماً؛ إن الدواء في القرص سيتمتصه من خلال خدك.
 - بعد 30 دقيقة، يمكنك ابتلاع ما تبقى في فمك مع بعض الماء.
- !** تقول عبوة MS-2 Step أن تأخذ الميزوبروستول بعد 36-48 ساعة، لكننا نسمح بـ 24-48 ساعة حيث يمنحك المزيد من الخيارات لموعد تناول الحبوب.

يتم امتصاص
الأقراص من
خلال خدك



الخطوٌتان للإجهاض الدوائي

يحدث الإجهاض الدوائي في خطوتين. ستأخذين حبَّتين مختلفتين تعملان معاً لإنهاء الحمل.

الخطوة 1 (ميغيبيريستون)


تسمى حبة منع الحمل الأولى التي ستتناولينها ميفيريستون. إنَّ ميفيريستون هو مضاد للهرمونات. سوف يوقف الهرمون اللازم لتطور الحمل.

- ستأخذين عادة قرص الميفيريستون أثناء وجودكِ في العيادة
- يتم ابتلاع هذا القرص مع الماء
- لن يشعر معظم الأشخاص بأي شيء بعد تناول هذا القرص، ويمكنهم القيام بأنشطتهم المعتادة، ومع ذلك:
- يكون لديكِ بعض النزيف الخفيف والتشنجات العضلية الخفيفة خلال هذا الوقت
- قد يكون لديكِ نزيف أشد، لكن هذا ليس شائعاً.

إذا كنتِ قلقة، يمكنكِ الاتصال بخطنا الداعم المجاني 24/7 على الرقم 1300 888 022.

ستبدئين الخطوة 2 عندما تكونين في المنزل. يجب عليكِ اختيار الوقت الذي يمكنكِ فيه البقاء في المنزل للراحة لمدة 6 ساعات على الأقل، وعندما تستطيعين إيجاد شخص داعم ليبقى معكِ.


بعد
علاجك



بين 30 دقيقة و 24 ساعة بعد تناول الميزوبروستول (عادةً في غضون 4-6 ساعات)، قد تشعرين بما يلي:

- تشنجات في رحمكِ
- نزيف من مهبلكِ
- البدء بخروج الحمل.

إذا لم تبدئي بالنزيف في غضون 24 ساعة، أو إذا كان لديكِ أي مخاوف،
يرجى الاتصال بخطنا الداعم المجاني 7 888 022 على الرقم 1300 !



إذا كنتِ لا ترغبين في متابعة عملية الإجهاض الدوائي في أي مرحلة،
فيرجى الاتصال بنا على الرقم 022 888 022 1300، حيث إنه توجد
مخاطر محتملة على الجنين من الدواء. !

ماذا تتوقعين أثناء الإجهاض الدوائي الخاص بك

هذه بعض الأعراض التي من المحتمل أن تشعري بها أثناء الإجهاض الدوائي. إذا شعرت بأي من الأعراض غير الشائعة أو إذا كنت قلقة بشأن أي شيء تشعرين به، يمكنك الاتصال بخطنا الداعم المجاني 24/7 على الرقم 1300 888 022.

نزيف


من المحتمل أنك ستترفين كميات أكبر من فترة الحيض المعتادة، ويجب أن يصبح النزيف أخف بعد خروج الحمل.

- قد تخرجين أيضاً بعض الجلطات (كتل)، والتي يمكن أن تكون بأحجام مختلفة
- يمكنك توقع حدوث بعض النزيف لمدة أسبوعين تقريباً
- قد يكون لديك بعض النزيف الخفيف حتى الدورة الشهرية التالية.



اتصلي بنا إذا كنت تعانين من نزيف شديد، مثل:

- انتلال تام لفوطة صحية نسائية ماكسي كل 30 دقيقة مدة أكثر من ساعتين
- خروج جلطات (كتل) أكبر من حجم كرة التنس
- نزيف شديد يستمر لأكثر من أسبوعين.



أكتب أي أسئلة لديك هنا.


إدارة الألم

إذا كنت تشعرين بالألم، يمكنك إدارته بهذه الطرق.

تدليك الرحم

إن التدليك المتكرر والثابت على منطقة بطنك السفلية سيساعد عضلات رحمك، ويمكن أن يقلل من النزيف والتشنجات. ويمكن أن يساعد أيضاً في منع تجلط الدم.

- استلقي على ظهرك أو اجلس على المرحاض أو في وضع مريح
- تحسسي أعلى عظم العانة، واضغطي بثبات ودلكي بيديك ناحية الأسفل. يمكنك استخدام أطراف أو مفاصل أصابعك أو كعب يديك.
- قومي بهذا التدليك كل ساعة لمدة 3 دقائق في كل مرة، في يوم إجهاضك، ثم 5 مرات في اليوم، أو حتى يتوقف التشنج/النزيف.
- إذا كنت تشعرين بالانزعاج أثناء التدليك، لا توقفي التدليك ولكن تناولي مسكنات الألم.
- ستقوم إحدى ممرضاتنا بشرح الطريقة لك قبل مغادرتك المركز.





وجع البطن

الألم في بطنكِ (أسفل البطن) طبيعي ويمكن أن يتراوح من خفيف إلى شديد. يجب أن يتحسن الألم بعد خروج الحمل. لا يستمر التشنج القوي عادة لأكثر من 24 ساعة. إذا كنتِ تشعرين بألم في بطنكِ، فهناك بعض النصائح في الجزء الخاص بإدارة الألم في هذا الكتاب.

اتصليني بـ ! إذا كنتِ تشعرين بـ

- تشنجات قوية لا تتحسن مع مسكنات الألم
- تشنجات قوية تستمر لأكثر من 24 ساعة
- قلق بشأن صحتكِ.

الآثار الجانبية الأخرى للدواء

يمكن أن يسبب الميوزوبروستول (الخطوة 2): الميوفيريستون (الخطوة 1):

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • الغثيان • التقيؤ • الإسهال • الدوخة • الحمى والقشعريرة. | <ul style="list-style-type: none"> • الصداع • الألم عند لمس الثدي • الإغماء • الهبات الساخنة • الحكة والطفح الجلدي. |
|---|--|

يمكن أن تكون هذه الآثار الجانبية شائعة، لكنها عادة لا تستمر طويلاً. هذه الآثار الجانبية ليست شائعة، ولكن إذا شعرت بها، فهي عادة تكون خفيفة.

التأثير على الحمل في المستقبل

لن يؤثر الإجهاض الدوائي الذي لم يكن له مضاعفات على فرصتكِ في أن تحملين في المستقبل.

حمى



شعور بالتعب أو أعراض إنهاك أو شبيهة بالإنفلونزا

ألم بطني مستمر (أسفل البطن)

إفرازات مهبلية غير عادية

أعراض الحمل

إذا شعرت بالغثيان (شعور بالإعياء) قبل علاجك، فمن المحتمل أن تتحسن حالتك في غضون 24 ساعة من إكمال العلاج.

- يمكن أن يستمر امتلاء الثدي أو الألم عند لمسهما لمدة أسبوع إلى أسبوعين. لا تعصري أو تدلكي ثدييك.
- غالباً ما تظل نتيجة فحص الحمل إيجابية لمدة أسبوعين وأحياناً إلى شهر بعد الإجهاض الدوائي.



اتصل بنا على الرقم **1300 003 707** إذا كنت قلقاً بشأن استمرار !
أعراض الحمل.

الحيض

يجب أن تحدث دورتك الشهرية الأولى من 4 إلى 8 أسابيع بعد الإجراء؛ لكن بعض وسائل منع الحمل قد تغير هذا.



اتصل بنا على الرقم **1300 003 707** إذا لم تحدث الدورة الشهرية في !
هذا الوقت.

العلاج الحراري

يمكنك وضع كيس ماء ساخن أو كيس قمح أو كمادة ساخنة في مكان موضع الألم.



- لا تضع الماء الساخنة على بشرتك مباشرة.
- اتبعي دائماً تعليمات المنتج.

الدواء

سيتم تزويديك بمسكنت للألم المعتدل أو الشديد.



اتبعي التوجيهات على العبوة ولا تتناول أكثر مما تنص عليه التعليمات.

بعد الإجهاض الدوائي الخاص بكِ

الحد من مخاطر العدوى (الالتهاب)

لتقليل فرص الإصابة بالعدوى، لا تضع أي شيء في المهبل لمدة أسبوع واحد.

- يشمل ذلك السدادات القطنية أو أكواب الدورة الشهرية أو الأصابع أو ممارسة الجماع المهيلي
- إذا كنتِ تتويني استخدام الحلقة المهبلية أو الحجاب الحاجز لمنع الحمل، فيرجى مناقشة ذلك مع الطبيب في موعدك.

المخاطر الطبية



ممارسة التمارين

بمجرد أن تشعري أنك بحالة جيدة بما فيه الكفاية، يمكنك القيام بأنشطتكِ وممارسة تمارينكِ المعتادة.

العودة إلى العمل

قد تكونين قادرة على إجراء الإجهاض الدوائي دون أي توقف عن العمل أو مع توقف قليل عن العمل.

! تحتاجين إلى الراحة في المنزل للخطوة 2، حتى تقل التشنجات ويخف النزيف.

- إذا كانت لديكِ وظيفة تتطلب مجهوداً بدنياً، فقد ترغبين في التوقف عن العمل لبعض الوقت.
- عندما تشعرين بتحسن يمكنكِ العودة إلى العمل
- تذكرى أن طلبي شهادة طبية أثناء موعدك. يمكن للشخص الداعم لكِ أيضاً طلب شهادة طبية.

المتابعة

إجراء المتابعة من 3-2 أسابيع بعد موعدك هو أمر ضروري للتأكد من نجاح الإجهاض.

- سيتم إجراء فحص خاص للحمل عن طريق البول لاستخدامه في المنزل في موعد لا يتجاوز 14 يوماً بعد إكمال الخطوة 1. كما ستكلمين التقليم الذاتي للتأكد من نجاح الإجهاض وعدم وجود مضاعفات. لقد تم تزويدك بورقة تعليمات للمساعدة في ذلك.
 - إذا كنت بحاجة إلى زيارتنا في العيادة لأي سبب من الأسباب، فسوف نحدد لكِ موعداً.
- لا تسافري إلى الخارج حتى تتم متابعتكِ وتأكد اكتمال علاجكِ.

الإجهاض الدوائي آمن للغاية، ولكن مثل أي علاج طبي، يتخلله بعض المخاطر. لا تشمل هذه المخاطر جميع المضاعفات، ولكنها الأكثر شيوعاً أو خطورة.


بقاء نسيج من الحمل أو جلطة (كتلة)

ما هو: قد تبقى كمية صغيرة من الأنسجة في الرحم، أو قد يتجمع الدم ويكون جلطة (كتلة). يمكن أن يسبب هذا نزيفاً شديداً و / أو نزيفاً طويلاً والألم و / أو ألمًا.

الإجراء/العلاج: قد يتطلب تناول المزيد من الأقراص أو عملية جراحية. لن تضطري للدفع لهذا إذا تم علاجك في إحدى عياداتنا.



يحدث في 4
من كل 100
شخص



أكتب أي أسئلة لديك هنا.

النزيف

ما هو: نزيف مفرط أو ملدة طويلة.

الإجراء/العلاج: قد تحتاجين إلى جراحة أخرى أو حقن سوائل عبر الوريد أو نقل دم في مستشفى محلي.

ملزيد من المعلومات حول احتمال الآثار الجانبية، يرجى رؤية موقعنا على الانترنت لنسبة حدوث مضاعفات مؤخرًا في عياداتنا.

الخطر


1 إلى 2 من
كل 100

شخص بحاجة
إلى جراحة

الخطر

1 إلى 2 من
كل 1000

شخص يحتاج
إلى نقل دم



● **ملزيد من المعلومات حول احتمال حدوث الآثار الجانبية، يرجى رؤية موقعنا على الانترنت لنسبة حدوث مضاعفات مؤخرًا من عياداتنا.**

التأثير على الحمل في المستقبل

لن يؤثر الإجهاض الدوائي الذي لم يكن له مضاعفات على فرصتك في أن تحمل في المستقبل.

استمرار الحمل


ما هو: يبقى الحمل وقد يستمر في النمو.
الإجراء/العلاج: قد تحتاجين إلى إعادة الإجهاض الدوائي أو عملية جراحية. لن تضطري للدفع لهذا إذا تم علاجك في إحدى عياداتنا.

إذا كان حملك مستمراً وقررت الاحتفاظ بالحمل، فقد يتسبب الدواء بأضرار للجنين.



الخطر

يحدث في 1 من كل 100 شخص



العدوى (الالتهاب)


ما هو: عندما تدخل البكتيريا إلى الجسم يمكن أن تسبب المرض. هذا غير شائع والعدوى (الالتهاب) الخطيرة الناتجة عن الإجهاض نادرة.

الإجراء/العلاج: سنقوم بفحصك للكشف عن العدوى (الالتهابات) وسنعطيك مضادات حيوية لتقليل خطر الإصابة بعدوى (التهاب).



الخطر

يحدث في أقل من 1 من كل 100 شخص



منع الحمل والرعاية اللاحقة



التأثيرات العاطفية

لكل شخص مشاعر مختلفة حول إجراءاته الخاصة. لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للشعور بعد الإجهاض. إذا كنتِ ترغبين في أي وقت في التحدث إلى شخص ما، فنحن نقدم خدمات استشارية مجانية. ببساطة اتصلي بنا على الرقم **003 707 1300** لحجز موعد.

إذا كان الحمل نتيجة للعنف الجنسي أو العائلي أو المنزلي، يمكنك أيضًا الاتصال بـ **1800 Respect**. يقدمون معلومات واستشارات ودعم 24/7 على الرقم **1800respect.org.au** أو يمكنك التحدث عبر الإنترنت على **1800 737 732**.

سنقدم لك معلومات حول خيارات منع الحمل الخاصة بك.

خيارات منع الحمل

في غضون أسبوعين فقط من علاجك، يمكن أن يطلق جسمك بويضة. لذا من الممكن أن تحملي مرة أخرى قبل دورتك الشهرية التالية. هذا هو السبب في أننا نقترح بشدة البدء في منع الحمل في أقرب وقت ممكن إذا كنت لا تريدين أن تحملين. يرجىأخذ الوقت الكافي لإلقاء نظرة على كتيب وسائل منع الحمل.

اسألي طبيبك أو ممرضتك عن صحائف الحقائق حول أي من وسائل منع الحمل التي تهمك.

يمكنك إجراء اختبار قصير حول منع الحمل عبر الإنترنت على contraception.org.au الموقع !



أكتب أي أسئلة لديك هنا.

خط الرعاية اللاحقة المجاني 24/7

إنّ خدمة هاتف الرعاية اللاحقة الخاصة بنا على مدار 24 ساعة تصلك بالممرضات المسجلات من ذوي الخبرة، في أي وقت من النهار أو الليل.

اتصل بـممرضاتنا للرعاية اللاحقة على الرقم 1300 888 022 إذا شعرت بأي من المشكلات التالية أو إذا كان لديكِ أي مخاوف:

- خروج جلطات (كتل) أكبر من حجم كرة التنس
- نزيف شديد يستمر مدة تزيد عن أسبوعين
- ابتلال تام لفوطة صحية نسائية ماكسي كل 30 دقيقة مدة أكثر من ساعتين
- حمى أو قشعريرة أو ألم شديد أو آثار جانبية أخرى تستمر أكثر من 24 ساعة بعد أخذ المراحلة 2 (الميزوبروستول)
- ألم شديد لا يتوقف في البطن
- الشعور بالغثيان بعد أكثر من أسبوع من علاجكِ
- الشعور بالتعب أو الإعياء بشكل عام
- آلام في الثديين مدة أسبوعين بعد الإجراء الذي قمت به
- عدم الحيض كالمعتاد، بعد 4-8 أسابيع من علاجكِ
- استمرار أعراض الحمل.




منع الحمل بعد الإجهاض الدوائي الخاص بك


في معظم الحالات، يمكنك البدء بوسيلة منع الحمل على الفور. إذا اخترت اللولب (IUD)، فيمكن إدخال هذا بمجرد تأكيد اكتمال الإجهاض.

- تعتبر خيارات منع الحمل القابل للعكس الطويل المفعول (LARC) (مثل اللولب، الزرع، الحقن) هي الأكثر فاعلية في منع الحمل.
- يمكننا تقديم وصفة طبية لخيارات منع الحمل الهرموني الأخرى مثل حبوب منع الحمل أو الحلقة المهبالية.
- يمكنك البدء في استخدام وسائل منع الحمل مثل حبوب منع الحمل أو الحلقة المهبالية في اليوم التالي للخطوة الثانية من علاج (الميزوبروستول) وستكون هذه الوسائل فعالة فوراً.

بعض النظر عن وسائل منع الحمل التي تستخدمنها، يجب أن لا تمارسي الجماع المهبلي لمدة أسبوع بعد علاجك.




الزرع



اللولب (IUD) الهرموني



الحقنة



اللولب (IUD) النحاسي

اتصلِي بنا إذا واجهتِ أي من المشاكل التالية أو إذا كان لديكِ أي مخاوف بخصوص:

- خروج جلطات (كتل) أكبر من حجم كرة التنس
 - نزيف شديد يستمر لفترة طويلة عن أسبوعين
 - ابتلال تام لفوطة صحية نسائية ماكسي كل 30 دقيقة لفترة أكثر من ساعتين
 - حمى أو قشعريرة أو ألم شديد أو آثار جانبية أخرى تستمر لأكثر من 24 ساعة بعد أخذ المراحلة 2 (الميزوبروستول)
 - ألم شديد لا يتوقف في البطن
 - شعور بالغثيان بعد أكثر من أسبوع من علاجِكِ
 - شعور بالتعب أو الإعياء بشكل عام
 - آلام في الثديين لفترة أسبوعين بعد الإجراء الذي خضعتِ له
 - عدم الحيض كالمعتاد، بعد 4-8 أسابيع من علاجِكِ
 - استمرار أعراض الحمل.
-


اتصلِي بنا على الفور إذا ظهرت عليكِ علامات محتملة للعدوى (للالتهاب):

- حمى
- شعور بإعياء بشكل عام (أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا)
- ألم مستمر في البطن
- إفرازات مهبلية غير عادية

حقوقكِ في الرعاية الصحية

يصف Australian Charter of Healthcare Rights (الميثاق الأسترالي لحقوق الرعاية الصحية) حقوق المرضى وغيرهم من الأشخاص الذين يستخدمون نظام الرعاية الصحية الأسترالي.

تُدافع MSI Australia عن حقوقكِ في:



إِصْفَاتِكِ أَحَدِ عَمَلَاء MSI Australia، فَأَنْتِ تَمْلِكِينَ الْحَقِّ فِي:

- أن تتم معاملتك بطريقة مهنية ومهذبة واهتمام
- أن يتم احترامك بغض النظر عن جنسك وعمرك وتوجهك الجنسي والإعاقة والدين والتنوع الثقافي واللغوي
- أن يتمأخذ مخاوفك واحتياجاتك وشكواك وآرائك على محمل الجد.

إِذَا نَلَبَيْ احْتِياجَاتِكَ وَمَتَطَلَّبَاتِكَ، فَيُمْكِنُكَ أَيْضًا تَصْعِيدُ شَكْوَكَ إِلَى الْهَيَّةِ الْمُسْتَقْلَةِ فِي وَلَايَتِكَ.



لمزيد من المعلومات حول حقوق الرعاية الصحية الخاصة بك والميثاق ، تصفحي SafetyandQuality.gov.au أو قومي بمسح رمز الاستجابة السريعة QR.

أشياء يجب معرفتها:

الموافقة

- من المهم أن تفهمي الإجراء وأيضاً أي مخاطر، وأن تكوني متأكدة من اختبارك.
- مخاطر الإجهاض الدوائي موصوفة في قسم المخاطر الطبية.
- سنطلب منك إعطاء موافقتك الخطية على الإجراء.

إذا لم تفهمي أي شيء في هذا الكتيب، أو إذا كان لديك أي أسئلة، أو إذا كنت تشعرين أنك تتعرضين للضغوط أو الإكراه، يرجى إعلامنا بذلك.

خدمات المترجم الشفهي

يرجى إعلامنا إذا كنت بحاجة إلى مترجم على الهاتف لمساعدتك على فهم أي من هذه المعلومات. إذا كنت بحاجة لمترجم في أي وقت قبل الإجراء الخاص بك أو بعده، يمكنك الاتصال بـ

TIS National (خدمة الترجمة الكتابية والشفهية الوطنية) على الرقم 131 450 واطلبي الاتصال بـ **MSI Australia** على الرقم 1300 003 707.

إمكانية الوصول إلى المستند

توفر نسخة نصية يمكن الوصول إليها لهذا المستند عبر الإنترنت على msiaustralia.org.au / **accessible**

يحتوي هذا الكتيب على معلومات حول الإجهاض الدوائي الخاص بك. اقرئي هذه المعلومات بعناية واحتفظي بها للنظر إليها لاحقاً. اطرحي علينا أسئلة إذا كان لديك أي منها بعد قراءتها.

تقديم شكوى أو إبداء رأي

إذا كنت ترغبين في إبداء أي آراء، يمكنك أن:

- تتحدثي إلى أي موظف في العيادة
- تكتبي مباشرة إلى العيادة
- تتصلين بالمركز الخاص بنا للدعم الوطني على الرقم 1300 003 707

تستخدمي استمارتنا الخاصة بإبداء الآراء على الصفحة الرئيسية موقعاً:

msiaustralia.org.au

